

# EMME-H

Fitoregolatore ad azione **sistemica** per il controllo selettivo dei germogli ascellari primari e secondari del tabacco.

Tipo di formulazione: (SC) Soluzione Concentrata

## Composizione:

- Idrazide maleica pura g. 16,1 (= 180 g/l)  
(contenente massimo 0,028 mg/kg d'idrazina)  
• Coformulanti q.b. a g.100

**INDICAZIONI DI PERICOLO: —**

**CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.**

**PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.**

**REAZIONE: —**

**CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.**

**SMALTIMENTO: —**

**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.**

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.**

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**

**Terapia: Sintomatica. Consultare un Centro antiveleni.**

## MODALITA' D'IMPIEGO

**Caratteristiche:** Attivo per azione sistemica. Inibendo la divisione cellulare impedisce selettivamente lo sviluppo dei germogli del tabacco.

**Coltura trattata:** Tabacco.

**Concentrazioni e dosi d'impiego:** S'impiega alla dose di 2-2,5 litri di prodotto diluito in 100 litri d'acqua. Nell'applicazione manuale si calcolano 15-20 ml di soluzione per pianta, corrispondente a 50-60 piante per litro di miscela. Nell'applicazione meccanica si usano 600 litri di soluzione per ettaro. Solo nel caso di piante vigorose la dose consigliata ad ettolitro può essere aumentata a 2,6-3,9 litri/ettolitro impiegando 400-600 litri di soluzione per ettaro.

**Epoche d'impiego:** La cimatura deve essere precoce e si tratta entro le 24 ore dalla cimatura.

**Metodi d'applicazione:** E' determinante per il buon esito che il prodotto venga assorbito dalle foglie della pianta. Sia nell'applicazione manuale che meccanica debbono pertanto essere impiegati ugelli produttori un getto nebulizzata e una pressione di 3 - 4 atm., bagnando bene la metà superiore della pianta.

**Numero d'applicazioni:** E' sufficiente un solo trattamento. Collocare il trattamento dopo un ciclo di raccolta delle foglie così da posizionare la successiva raccolta dopo circa una settimana. Interventi integrati con prodotti contattocidi come gli alcoli grassi o sistemici-locali come le dinitroaniline, prima e dopo il trattamento sono vivamente consigliati, specie nel caso di trattamenti meccanici.

**Avvertenze per l'impiego:**

- Bagnare uniformemente la parte superiore delle piante. Le foglie debbono essere asciutte e turgide. - Non trattare piante destinate alla produzione del seme.

- L'efficacia del trattamento dipende dalla quantità di sostanza attiva assorbita e dislocata dalla pianta, pertanto si consiglia di trattare quando la pianta è attiva: i giorni successivi a un'irrigazione, di prima mattina o con cielo nuvoloso. Si sconsiglia di trattare con temperature elevate, su piante appassite ed in presenza di vento.

- Attenzione: Il trattamento può procurare un ingiallimento delle foglie. Tale precoce ingiallimento non essendo indice di maturità fisiologica non può essere preso come riferimento per la raccolta.

**COMPATIBILITA' Usare il prodotto da solo.**

**FITOTOSSICITA'.** Non trattare piante ammalate, malnutrite o comunque sofferenti. Rispettare le dosi consigliate.

AGRICOS.r.l. - Viale Gian Galeazzo, 3 - 320136 Milano  
Telefono: +39 02 80896201

Stabilimento produttore:

**DREXEL CHEMICAL COMPANY - Memphis, TN, U.S.A.**

Taglie autorizzate: Litri 5; Litri 10; Litri 20; Litri 50

Partita No:

Registrazione del Ministero della Sanità N. 10224 del 20.12.1999

## ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**NON APPLICARE CON MEZZI AEREI  
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA  
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO DA  
NON VENDERSI SFUSO  
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI  
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE  
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**