



HADDEN

Erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza di frumento tenero e duro, avena, orzo, triticale, segale
Granuli idrodispersibili - Gruppo HRAC B -Erbicida

COMPOSIZIONE:

100 g di prodotto contengono:
Tifensulfuron metile puro g 40
Tribenuron metile puro g 15
Coformulanti q.b. a g 100

Titolare della registrazione:

ROTAM AGROCHEMICAL EUROPE LIMITED
Hamilton House, Mabledon Place, London - WC1H 9BB
(Regno Unito) - Tel. +44-2-079 530447

Officine di produzione:

Jiangsu Rotam Chemistry Co., Ltd - Jiangsu (R. P. Cinese)
Lanting Cropscience Co., Ltd - Ping Tung Hsien, Taiwan
(R. P. Cinese)
Sipcam S.p.A - Salerano sul Lambro (MI)

Distribuito da:

ROTAM AGROCHEMICAL EUROPE S.A.S.,
75 cours Albert Thomas, 69003 Lyon (Francia)

Registrazione n.16171 Ministero della Salute del 16/10/2014

Contenuto netto: 200 g

Paritita n°: Vedi corpo della confezione



Prescrizioni supplementari:

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza vegetale non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali. Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri della zona non coltivata.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Non sono al momento noti casi di intossicazione o di avvelenamento nell'uomo. In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso, se possibile mostrargli l'etichetta.
Terapia: Sintomatica

Consultare un Centro Antiveleeni

EPOCA DI IMPIEGO

Post-emergenza: di frumento tenero e duro, avena, orzo, triticale e segale a semina primaverile e invernale, dallo stadio di tre foglie fino allo stadio di botticella della coltura. HADDEN viene rapidamente assorbito da foglie e radici e traslocato agli apici vegetativi delle piante trattate, subito dopo l'assorbimento, HADDEN blocca la crescita delle materie sensibili con sintomi visibili (ingiallimento, necrosi e successiva morte) che possono manifestarsi da 1 a 2 settimane dall'applicazione. Le malerbe non deitalizzate sono drasticamente ridotte nello sviluppo e sono molto meno competitive nei riguardi della coltura. Condizioni di caldo e umido dopo il trattamento favoriscono la velocità di azione.

Dosi d'impiego: 80-100 g/ha da distribuire con 200-400 litri di acqua. La dose più bassa si applica su infestanti e colture poco sviluppate, quella più alta nei trattamenti tardivi

SPETTRO D'AZIONE

Infestanti sensibili
Camomilla bastarda (*Anthemis arvensis*), Senape nera (*Brassica nigra*), Miegro (*Cassia irregularis*), Falsa ortica (*Lamium purpureum*), Camomilla selvatica (*Melicaria incolora*), Non-t-sordar-di-me (*Myosotis arvensis*), Poligono convolvolo (*Fallopia convolvulus*), Trifoglio bianco (*Trifolium repens*)

Infestanti medianamente sensibili
Centocchio dei campi (*Agrostis arvensis*), Borsa del pastore (*Capsella bursa-pastoris*), Farinello comune (*Chenopodium album*), Geranio sbrindellato (*Geranium dissectum*), Camomilla (*Melicaria recutita*), Papavero (*Papaver rhoeas*), Senape selvatica (*Sinapsis arvensis*), Centocchio comune (*Stellaria media*), Viola dei campi (*Viola arvensis*)

AVVERTENZE AGRONOMICHE

Il prodotto contiene principi attivi inibitori dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, si consiglia di alternare a questo erbicida prodotti aventi un differente

COMPOSIZIONE:
100 g di prodotto contengono:
Tifensulfuron metile puro g 40
Tribenuron metile puro g 15
Coformulanti q.b. a g 100



ATTENZIONE

INDICAZIONE DI PERICOLO

Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Contiene tribenuron metile.

Può provocare una reazione allergica.

Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Non disperdere nell'ambiente.

Raccogliere il materiale fuoriuscito.

Smaltire il prodotto/recipiente in i punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali.

Contenuto netto: 200 g

Paritita n°: Vedi corpo della confezione



meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio: la rotazione culturale e la falsa semina.

PREPARAZIONE DELLA POLITIGLIA

Sciogliere la dose stabilita di HADDEN nel serbatoio dell'irroratrice riempita circa ad un quarto, mantenendo l'agitatore in funzione; portare a volume il serbatoio ed eseguire il trattamento, tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali fermate, con irroratore chiuso. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo.

AVVERTENZE: Nell'esecuzione del trattamento utilizzare sempre attrezzature pulite, evitando sovrapposizioni e chiudendo l'irroratore durante le fermate ed i cambiamenti di direzione. Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale. Subito dopo il trattamento è importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue:

- a) Risciacquare completamente ed in modo accurato tutta la superficie interna del serbatoio riempito con almeno il 10% di acqua pulita, controllando la completa rimozione di ogni deposito visibile. Lavare per mezzo di un getto ad elevata pressione la pompa, i filtri e la barra e successivamente fare scolare il liquido di risulta dal serbatoio.
- b) Rimuovere i filtri e le ghiera degli ugelli e lavare queste parti separatamente.
- c) Ripetere il risciacquo e le operazioni di cui al punto a).

Dopo il trattamento con HADDEN si sconsiglia la trasemina di leguminose foraggere.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 16/10/2014