

VEXTAMITRON 700 SC

Diserbante selettivo per la barbabietola da zucchero e da foraggio

Tipo di formulazione: Sospensione concentrata

MoA HRAC: C1

Vextamitron 700 SC - Composizione
- Metamitron g. 58 (= 700 g/L)
- Coformulanti q.b. a g.100

VEXTACHEM S.r.L.

Piazza B. Buozzi 9 – 04100 Latina

Tel. 0773 1711302

ATTENZIONE



Indicazioni di pericolo: H302: Nocivo se ingerito. H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Consigli di prudenza: P264: Lavare accuratamente le mani e le parti del corpo esposte dopo l'uso. P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P301+312: In caso di ingestione: in caso di malessere, contattare un centro antiveneni/un medico. P391: Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente.

Autorizzazione Ministero della Salute n. 16607 del 29/7/2019

Stabilimenti di Produzione:

Zhejiang Tide CropScience Co., Ltd.

No. 11 Linhai Road – Paojiang Industrial Zone

Shaoxing (312071) – Cina

Phyteurop, 55, rue Raspail CS 80105, 92594 Levallois-Perret Cedex – Francia

Chemark Kft., 8182 Peremartonyártelep, PO Box 31, Ungheria

Diachem S.p.A., Via Mozzanica 9/11, 24043 Caravaggio (BG)

Taglie: 1, 5, 10 L

Partita n:

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Il prodotto non deve essere applicato nelle immediate vicinanze delle acque superficiali e costiere. Indossare guanti protettivi durante la miscelazione, il carico e l'applicazione del prodotto; indossare tuta da lavoro e stivali impermeabili durante l'applicazione.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Avvertenza: consultare un Centro Antiveneni.

CARATTERISTICHE: Vextamitron 700 SC è un erbicida selettivo ben tollerato dalle colture con azione di contatto e residuale, assorbito per via fogliare e radicale, per il controllo di infestanti annuali nella barbabietola da zucchero e da foraggio. Vextamitron 700 SC viene assorbito dalle infestanti per via radicale in fase di emergenza.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO: Vextamitron 700 SC può essere applicato con un intervento in pre-emergenza seguito da un intervento in post-emergenza o in un programma di post-emergenza alle condizioni riportate di seguito.

Coltura	Dose massima (L/ha)	Numero di trattamenti	Dose massima annuale (L/ha)	Volume d'acqua (L/ha)
Barbabietola da zucchero	2.0	3	5.0	200-300
Barbabietola da foraggio	2.0	3	5.0	200-300

1. Applicazione in fase di pre-emergenza della barbabietola seguita da applicazioni in post-emergenza:

Una prima applicazione di Vextamitron 700 SC deve essere effettuata in fase di pre-emergenza della coltura alla dose di 1.5-2 L/ha.

Una seconda applicazione alla dose di 1.5 L/ha deve essere effettuata in fase di post-emergenza della coltura, alla prima comparsa delle piante infestanti, quando queste ultime si trovano allo stadio di cotiledoni in fase di espansione. Un'ulteriore applicazione alla dose di 1.5-2 L/ha deve essere effettuata alla germinazione delle nuove piante infestanti (fino allo stadio BBCH 18 della coltura).

2. Programma di post-emergenza:

La prima applicazione deve essere effettuata nello stadio di cotiledone delle piante infestanti che germinano per prime. Il trattamento deve essere ripetuto ogni volta che le nuove piante infestanti raggiungono lo stadio di cotiledone, fino a quando cessa la germinazione delle infestanti. Se le infestanti sopravvivono alla prima applicazione 7-10 giorni dopo il trattamento, è necessario effettuare un'altra applicazione alla dose di 2 L/ha anche se non sono germinate nuove infestanti in tale lasso di tempo (fino allo stadio BBCH 18 della coltura).

SPETTRO D'AZIONE

Infestanti molto sensibili: camomilla (*Matricaria chamomilla*) e viola dei campi (*Viola arvensis*).

Infestanti sensibili: erba storna comune (*Thlaspi arvense*), centocchio (*Stellaria media*), farinello comune (*Chenopodium album*) e falsa camomilla (*Matricaria inodora*).

Infestanti moderatamente sensibili: amaranto comune (*Amaranthus retroflexus*), fienarola annuale (*Poa annua*).

COMPATIBILITÀ: Vextamitron 700 SC è compatibile con tutti gli erbicidi comunemente usati su barbabietola da zucchero e da foraggio in pre- e post-emergenza. È sconsigliato miscelare il prodotto con formulazioni contenenti amminoacidi o lecitina. Il titolare della registrazione declina ogni responsabilità per potenziali effetti negativi delle miscele. Leggere attentamente anche l'etichetta del prodotto da aggiungere alla miscela prima di utilizzarlo con Vextamitron 700 SC. Ogni operatore è tenuto a verificare su piccola scala la miscibilità dei prodotti nelle condizioni pratiche/effettive in cui opera (es. caratteristiche dell'acqua, pH, temperatura).

GESTIONE DELLA RESISTENZA

Vextamitron 700 SC contiene il p.a. metamitron caratterizzato da azione di inibizione della fotosintesi a livello del fotosistema II (Gruppo HRAC C1). L'uso ripetuto di prodotti con il medesimo meccanismo d'azione può determinare la selezione di infestanti resistenti. Per evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti si consiglia di miscelare e/o alternare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale, il diserbo meccanico e la falsa semina. Monitorare l'eventuale riduzione di sensibilità delle malerbe.

AVVERTENZE: Vextamitron 700 SC è indicato per l'uso su tutte le varietà di barbabietola da zucchero coltivate in terreni minerali e organici. Solo in caso di miscela con altri erbicidi la compatibilità con le barbabietole può risultare temporaneamente compromessa in condizioni sfavorevoli per la crescita, come ad esempio gelo e variazioni di temperatura estreme. È necessario rispettare le istruzioni per gli altri prodotti aggiunti alla miscela, specialmente se i trattamenti vengono effettuati dopo periodi di tempo freddo-umido seguiti da un forte aumento della temperatura. In tali condizioni è necessario rispettare un tempo di attesa di almeno un giorno. Con luce solare intensa e temperature diurne superiori ai 25°C, effettuare i trattamenti nelle ore serali, più fresche.

Dopo l'uso di Vextamitron 700 SC è possibile seminare colture di barbabietole in qualsiasi momento. Con un'interruzione di 16 settimane dopo l'ultima applicazione di Vextamitron 700 SC, è possibile seminare cereali vernini nella stessa stagione. Le colture primaverili possono essere seminate nella stagione successiva all'uso di Vextamitron 700 SC.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso.